

SCHEDA S.I.C. IT3120088 "Palù di Monte Rovere"

Note alla legenda della carta:

Nome in carta	Codici di riferimento	Note sulla composizione dell'habitat (mosaici e transizioni ad altri codici)
Abieteti con faggio dei suoli mesici	9130	Circondano i pascoli entro cui si apre la zona umida
Aree prive di vegetazione e/o soggette a intenso disturbo	-	Zone di recente realizzazione di impianti sciistici e zona fangosa di abbeverata nel pascolo
Laghi eutrofici	3150	Piccolo specchio d'acqua poco profondo con ninfee e nufar
Pascoli montani pingui	-	Il tipo di vegetazione prevalente nelle aree aperte
Pecceta secondaria (rimboschimenti)	-	Nuclei di abete rosso sul pascolo, con alcune zone di impianto recente
Vegetazione a megaforbie di sponde e radure umide	6431	Nelle zone di oscillazione del livello di falda, tra lago e pascolo si insedia una veg. rigogliosa con megaforbie e elementi di molinieto (6410) e torbiera bassa (7230)

Principali habitat presenti cfr. dir. 92/43/EEC:

codice e denominazione "natura 2000"		prioritario s/n	commento
3150	<i>Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition - type vegetation</i>	n	Acqua libera coperta da idrofite
6410	<i>Molinia meadows on calcareous, peaty or clayey-silt-laden soils (Molinion caeruleae)</i>	n	Unico complesso di elevato valore; da valutare la riferibilità del codice 7210*
6431	<i>Humid tall herb fringes of watercourses and woodlands</i>	n	
7230	<i>Alkaline fens</i>	n	
9130	<i>Asperulo-Fagetum beech forests</i>	n	Pendici circostanti

Note e osservazioni

Articolazione della vegetazione:

- Sito d'ambiente mesalpico/montano conformato ad ampia conca, con morfologia prevalente subpianeggiante.
- Al centro della conca è presente un laghetto quasi del tutto occupato da vegetazione natante (ninfee e nufar); sui bordi acqua con bassa equiseti, schoenoplectus, alisma plantago.
- Intorno al lago fascia di prato umido con lisimachia, filipendula ecc. e carici cespitosi (C. elata).
- Il resto della conca è occupato da un pascolo pingue, con limitate zone più magre (a sesleria) e aree di invasione nitrofila.
- Un abietetto con faggio di notevole fertilità circonda la conca.

Emergenze:

- Seriazione della vegetazione acquatica, di ambiente palustre e di prato umido.

Dinamiche in atto:

- Sviluppo delle infrastrutture turistiche.
- Trasformazione dell'uso pastorale con riflessi sulla qualità del pascolo.

Spunti gestionali:

- Regolamentazione dell'uso turistico.
- Regolamentazione dell'uso pastorale.
- Valorizzazione e delle formazioni arboree adiacenti.